

# 経鼻インフルエンザ生ワクチン（フルミスト）の 接種を希望される方へ

**フルミストについての大切な説明文書です。必ずお読みください！**

## 《フルミストとは？》

- ・フルミストは、鼻の中へ吹き付けるインフルエンザ予防のための弱毒化生ワクチンです。従来のインフルエンザの不活化ワクチンの注射と違い、鼻腔内にスプレーを吹きかけるだけなので痛みがありません。
- ・フルミストは生きたウィルスで免疫を作るため、流行しているインフルエンザと株が違っていても発症を軽症化させる作用があると考えられています。
- ・効果は1シーズンですが、従来の注射型のインフルエンザワクチンよりも効果が長く持続します。
- ・フルミストには、インフルエンザA型2種類、B型2種類の計4種類の株が入っています。インフルエンザウィルスは主に気道粘膜に感染しますが、鼻腔に直接免疫をつけるフルミストは、従来の注射でのワクチンによって誘導されるIgG抗体だけでなく、気道分泌型のIgA抗体も得られるため、予防効果が（特に小児において）高いと考えられています。ただし人種や地域により効果は様々であり、接種しても必ず感染を予防するものではありません。

## 〈Topics〉

アメリカCDC予防接種諮問委員会から「ここ数年間のフルミストの予防効果は低かった」との理由で、2016-2017年シーズンはフルミストを推奨しないとのコメントが出ましたが、**2018年シーズンより一転、再度推奨することを決定しております。**

ちなみにカナダにおける2012-2015年の3シーズンの調査や、イギリス・フィンランドの調査でも、フルミストの予防効果が高いことが証明されており、今シーズンも経鼻インフルエンザ生ワクチンを採用することが決まっています。現在、日本でも厚労省での認可が待たれています。

## 《ユアクリニックで使用するワクチンについて》

薬剤名：フルミスト（FluMist）

製造元：MedImmune

販売元：アストラゼネカ カナダ

\*2003年にアメリカ食品医薬品衛生局に認可されたワクチンで、**15年以上の安全な実績**があります。

2011年からヨーロッパでも認可され発売されていますが、日本の厚労省では未承認となっています。

## 《接種対象者》

2歳以上49歳以下の健康な人。

（激しく泣いてしまうお子様は多量の鼻汁などにより効果が低下するため、接種できない場合があります）

## 《接種できない方》

- ・5歳未満で今までに喘息があった方、1年以内に喘息の発作があった方。
- ・免疫不全の方。また免疫不全の方と接触する機会のある方。
- ・妊婦または妊娠の可能性のある方。
- ・アスピリン内服中の方。
- ・重度の卵アレルギーをお持ちの方。また、アナフィラキシーの既往をお持ちの方。
- ・37.5℃以上の熱がある方。

## 《接種料金と接種回数》

1回 8000円 (税込)

1回接種

\*ただし9歳未満でインフルエンザワクチンを接種したことのない方、  
またはインフルエンザに罹患したことのない方は4週以上の間隔をあけて2回。

## 《副反応について》

接種後、30～40%の方に鼻水症状がでることがあります。

その他、咽頭痛や咳などの軽い風邪のような症状が出ることがあります。

また頻度はまれですが、発疹・じんましのほか、アナフィラキシーショックやギランバレー症候群のような重い反応を起こす可能性は、他のワクチンと同様に否定できません。

## 《予防接種による健康被害救済について》

**\*公的な補償制度は適応されません。**

フルミストの接種による健康被害が起こった場合、国内未承認のため「予防接種健康被害救済制度」による補償や、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく給付は受けられませんが、万が一、障害1級・2級に分類されるような重篤な副作用や死亡などの健康被害が発生した場合には輸入商社 (Monzen Corporation) による「輸入ワクチン副作用被害救済制度」による補償を受けることができます。ただし保障が適用・給付される条件があります。

## 《同時接種について》

フルミストは国内未承認ワクチンで公的な補償制度がないため、他のワクチンとの同時接種で万が一予防接種被害が生じた場合、他のワクチンが原因であっても「予防接種健康被害救済制度」も受けられなくなる可能性があるため、**ユアクリニックでは同時接種を行いません。**

## 《接種当日・接種後の注意について》

- ・この説明文書をよくお読みになり、**十分ご理解・納得された上で**問診票（同意書）へ、本人または保護者の方がサインをし、ご提出ください。
- ・**高校生以下の方は、母子手帳をご持参されない場合は接種することができません。**
- ・接種の前にご不明な点などがあれば直接医師へお問い合わせください。
- ・接種後30分ほどは、すぐにクリニックに戻れる場所にいていただき、副反応などがいないか十分観察してください。
- ・接種当日の入浴は構いません。
- ・フルミストは生ワクチンですので、女性の方は1ヶ月間ほど妊娠をお控えください。